

kodan® forte gefärbt – Lösung zur Hautdesinfektion

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

kodan forte gefärbt – Lösung zur Hautdesinfektion  
Wirkstoffe: 1-Propanol, 2-Propanol, Biphenyl-2-ol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder Ihrer Pflegefachkraft an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder Ihre Pflegefachkraft. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn sich nach mehrmaliger Anwendung kein Erfolg zeigt oder gar eine Verschlechterung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist kodan® forte gefärbt - Lösung zur Hautdesinfektion und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von kodan® forte gefärbt - Lösung zur Hautdesinfektion beachten?
3. Wie ist kodan® forte gefärbt - Lösung zur Hautdesinfektion anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist kodan® forte gefärbt - Lösung zur Hautdesinfektion aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist kodan® forte gefärbt und wofür wird es angewendet?**

kodan® forte gefärbt ist ein Desinfektionsmittel zur äußeren Anwendung auf der Haut.

#### Anwendungsgebiete:

Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien, wenn eine farbliche Markierung des desinfizierten Hautbereiches gewünscht wird.

### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von kodan® forte gefärbt beachten?**

**kodan® forte gefärbt darf nicht angewendet werden,**  
wenn Sie allergisch gegenüber 1-Propanol, 2-Propanol, Biphenyl-2-ol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie kodan® forte gefärbt anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen. Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute bringen.

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten Heizquellen bringen. Thermokauter und andere elektrische Geräte erst ansetzen, wenn die desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Direkter Kontakt des Arzneimittels mit Röntgenauflagen muss vermieden werden.

### **Kinder und Jugendliche**

Für Kinder und Jugendliche gelten die gleichen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen wie für die Anwendung bei Erwachsenen.

### **Frühgeborene und Neugeborene**

kodan<sup>®</sup> forte gefärbt soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut angewendet werden.

### **Anwendung von kodan<sup>®</sup> forte gefärbt zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit, und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

kodan<sup>®</sup> forte gefärbt kann kleinflächig angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Die Anwendung von kodan<sup>®</sup> forte gefärbt hat keine Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## **3. Wie ist kodan<sup>®</sup> forte gefärbt anzuwenden?**

Wenden Sie kodan<sup>®</sup> forte gefärbt immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zur Hautdesinfektion bis zur vollständigen Benetzung auf die Haut auftragen oder aufsprühen und vor Punktionen, Exzisionen und Injektionen unverdünnt mindestens 15 Sek., vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie vor operativen Eingriffen unverdünnt mindestens 1 Min. einwirken lassen.

Vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut wiederholt auftragen und 2 Min. einwirken lassen.

### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Die Anwendung ist bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen identisch.

### **Wenn Sie eine größere Menge von kodan forte gefärbt angewendet haben, als Sie sollten**

Erkenntnisse zu Überdosierungen liegen nicht vor. Eine Überdosierung ist jedoch bei einer topischen Zubereitung sehr unwahrscheinlich.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeiten zugrunde gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (<1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Sehr selten: Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Trockenheit, allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem)

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist kodan<sup>®</sup> forte gefärbt aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach (Verwendbar bis) angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch des Arzneimittels nicht länger als 12 Monate, jedoch nicht über das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum hinaus anwenden. Nicht über 25° C lagern.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

Was kodan<sup>®</sup> forte gefärbt enthält

Die Wirkstoffe sind: 10,0 g 1-Propanol, 45,0 g 2-Propanol, 0,2 g Biphenyl-2-ol in 100 g Lösung

Die sonstigen Bestandteile sind: Wasserstoffperoxydlösung, gereinigtes Wasser, Farbstoffe Chinolingelb E 104, Gelborange S E 110, Brillantschwarz BN E 151.

**Wie kodan<sup>®</sup> forte gefärbt aussieht und Inhalt der Packung**

Kunststoffflaschen 500 ml und 1 L mit rotem Originalitätssiegel-Klappdeckelverschluss.

Klare, bräunliche Lösung

**Zulassungsnummer**

1-24118

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

**Zulassungsinhaber**

Schülke & Mayr Ges.m.b.H, Seidengasse 9, 1070 Wien

Tel. Nr.: (01) 523 25 01

**Hersteller:**

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Deutschland

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2015.**